

# Přeprava telat

## ✓ Přeprava mladých telat

**C alvové** — zejména po odstavení – jsou **velmi náchylné** k nemocem (jako jsou onemocnění dýchacích cest a gastrointestinálních onemocnění). Doprava je může snadno zdůraznit. Kromě toho se mladí telata obtížně zvládají jako líheňinstinct. Osvědčené postupy pro **nakládání** s odpady zabraňují nežádoucím důsledkům a budou přínosem pro další aspekt živočišné výroby (např. cíl spočívající v přírůstku tělesné hmotnosti či méně nemocí).



© Henk van Dommelen




- Telata s **nezhobenými houbami**: zakázaná přeprava
- **Telata do 10 dnů**: povolená přeprava maximálně 100 km za zvláštních okolností
- **Telata do 14 dnů**: zakázané **dlouhotrvající cesty**
- **Ještě lépe!** Přeprava odstavených telat po 8 týdnech
- Pokud jde o telata ležící na zastávkách, **obraťte se na veterinárního lékaře**.

- Poskytnout **vhodnou podestýlku** (např. slámu), která zaručuje pohodlí odpovídající počtu zvířat, dobu trvání cesty, počasí a absorpci moči a výkalů
- Použití **boční ochrany** na palubě, aby se zabránilo uvíznutí nohou telat mezi palubou a bočními stěnami.
- Pokud se telata zpracovávají ve **skupině**, omezí velikost skupiny na **10–15 telat**
- Pokud se použije rampa, sklon by měl být co nejvíce snížen (max. úhel 20 °, 36 %)
- Napínací **telatas individuální** nápoředou na rampě
- V případě **dlouhotrvajících cest**; zavolejte hospodářství nebo kontrolní stanoviště k zajištění okamžitého zalévání a krmení při příjezdu a vhodných klimatických podmínek telat (např. předeřtátí budovy)
- Je **zakázáno mutlit telatům!**



© Henk van Dommelen



## ✓ Přeprava telat

### Krmení a napájení



#### Neodstaveným telatům [...]

Poskytování tekutého krmiva pro telata je považováno za nepraktické s největší konstrukcí nákladních automobilů. Proto **by mohlo být nutné, aby byla telata vyložena**, aby jim byla poskytnuta tekutá krmiva během zastávek.



#### Odstavená telata

Poskytnout přípojnému telata koncentrát na bázi graininu na odpočívadlech. Avšak **pouze v případě, že jsou telata zvyklá stravovat se stravou**. Náhlé změny mohou způsobit, že se stanou nemocnými.

Dobře tekutá krmiva: 2 L/12 hodin

- **Telata krmená jednotlivě a doba odpočinku v délce nejméně 1 hodiny** před opětovným zahájením cesty
- Ujistěte se, že **systém pití** je čistý, dobře udržován a funguje.
- Zajistit, aby byla telata **dobře obeznámena se systémem** napájení s cílem dodávat mléko, mléčné krmné směsi nebo elektrolytická řešení správné teploty (např. použití pryžových struků)
- Pokud telata nevědí, jak používat konzul, uchovejte si malé kapání u pístu, aby bylo možné **dát podnět k pití**, nebo využít prstem k jejich orientaci.
- **Pečlivě sledovat telata**, aby byl zajištěn odpovídající příjem. Pokud telata z pitné vody nepijí, nabízejí mléko/vodu manuálně

### Teplota

**Optimální teplota:** 5°C až 25°C. udržovat stabilní teplotu, **vzhledem k tomu, že telata jsou citlivá na teplotní změny**



- Poskytovat **více podlahové plochy**
- Další **ventilátory** pro ventilaci
- V případě potřeby se **posype vodou**
- V průběhu zpoždění se **telata ručně chovají**.
- Nepřepravují se při teplotě vyšší než 30 °C.



- **Předteplá vozidla** před nkládkou
- Poskytnutí **dodatečné podestýlky**
- V případě potřeby uplatnit **další vytápění**