



ANIMAL TRANSPORT GUIDES

Prijevoz teladi

Stranica 1

Poveznica na sve vodiče i informacije:
www.animaltransportguides.eu



Prijevoz mlade teladi

Telad – osobito u vrijeme odbijanja – vrlo su **prijemljiva** na bolesti (respiratorne i želučano-crijevne bolesti). Prijevoz im lako može uzrokovati stres. Dodatno, mladom je teladi teško baratati kao skupinom – instinkt stada još nije razvijen. **Dobrim praksama rukovanja** životinjama sprječavaju se neželjene posljedice, a koristi imaju i drugi aspekti proizvodnje životinja (primjerice bolja početna tjelesna masa ili manje bolesti).



©Henk van Dommelen

Opći savjeti

- Telad kod koje **pupak nije zarastao**: svi prijevozi zabranjeni.
- **Telad mlađa od 10 dana**: prijevoz dopušten do max. 100 km, pod posebnim uvjetima.
- **Telad mlađa od 14 dana**: zabranjena duga putovanja.
- **Još bolje!** Prevozi odbijeno tele starije od 8 tjedana.
- Ako tele ostane ležati pri zaustavljanju, **kontaktiraj veterinara**.



Priprema za prijevoz teladi

- Osiguraj **primjerenu stelju** (primjerice slamu) koja jamči primjerenu udobnost s obzirom na broj teladi na vozilu, duljinu putovanja, vremenske prilike i upijanje urina i fecesa.
- Koristi **bočnu zaštitu** na platformi da bi se spriječile ozljede zbog uklještenja nogu između poda platforme i stjenke platforme.
- Kad se teladi rukuje u **skupini**, ograniči veličinu skupine na **10 – 15 teladi**.
- Ako se koristi rampa, nagib treba biti što je moguće manji (max. kut of 20° odnosno 36%).
- Pri utovaru **teladi** osiguraj im **individualnu** pomoć u svrhu lakšeg kretanja rampom.
- U slučaju dugih putovanja nazovi farmu ili odmorište tako da odmah po dolasku teladi bude osigurano napajanje i hranjenje kao i primjereni klimatski uvjeti (primjerice prethodno grijanje objekta).
- Teladi se **ne smiju stavljati brnjice!**



©Henk van Dommelen




©IDELE



Prijevoz teladi

Hranjenje i napajanje



©Dr. Rabitsch

Neodbijena telad

Odredba o osiguranju tekuće hrane teladi u tranzitu smatra se nepraktičnom za većinu vozila. Stoga **telad može biti potrebno istovariti** da bi im se mogla dati tekuće hrana tijekom zaustavljanja.



Odbijena telad

Na mjestima zaustavljanja osiguraj teladi koncentriranu hranu na osnovi žitarica. Ali **samo ako je telad navikla na takvu prehranu**. Iznenađne promjene mogu uzrokovati bolesti teladi.

Dobro hranjenje tekućom hranom: 2 l/12 sati

- **Telad hrani individualno** i osiguraj im **odmaranje u trajanju od najmanje 1. sata** prije nastavka putovanja.
- Osiguraj da je **sustav za napajanje** čist, dobro održavan i u radnom stanju.
- Osiguraj da je telad upoznata s **opremom za napajanje** mlijekom, zamjenom za mlijeko ili otopinom elektrolita odgovarajuće temperature (primjerice koristi gumene dude).
- Ako telad ne zna kako koristiti pojilice, održavaj mlaz tekućine na pojilici kako bi se telad **potaknulo da počne piti** ili koristi prst da ih navedeš da počnu piti.
- **Nadziri telad tijekom pijenja** da bi se osiguralo da su popili dovoljnu količinu tekućine. Ako telad nije u stanju koristiti sustav za napajanje na vozilu, ponudi im hranu/vodu ručno.

Temperatura

Optimalna temperatura: +5°C do +25°C. Održavaj stabilnu temperaturu, jer je telad osjetljiva na promjene temperature



- Osiguraj veću **podnu površinu**.
- Dodatni **ventilatori** za ventilaciju.
- Ako je potrebno, poprskaj ih vodom.
- Tijekom kašnjenja **napajaj telad ručno**.
- Nemoj prevoziti telad na temperaturi višoj od **+30 °C**.



- **Ugrij vozilo** prije utovara.
- Osiguraj **dodatnu stelju**.
- Kad je potrebno, osiguraj **dodatno grijanje**.