

Transport von Kälbern



Transport junger Kälber

Kälber sind – vor allem zum Zeitpunkt des Absetzens – **sehr anfällig** für Krankheiten (wie Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen). Ein Transport kann schnell zu einer Belastung werden. Zusätzlich sind junge Kälber schwer als Gruppe zu handhaben – der Herdeninstinkt ist noch nicht entwickelt. **Angepasster Umgang** verhindert negative Konsequenzen für die weitere Entwicklung und wird anderen Aspekten der Tierproduktion zugute kommen (z. B. bessere Zunahmen oder weniger Krankheiten).



©Henk van Dommelen



- Kälber mit nicht vollständig verheiltem Nabel: nicht Transportfähig
- Kälber unter 10 Tagen: Transport für max. 100 km unter bestimmten Umständen
- Kälber unter 14 Tagen: lange Transporte verboten
- Noch besser! Abgesetzte Kälber transportieren
- Wenn ein Kalb in Fahrtpausen liegen bleibt, kontaktieren Sie einen Tierarzt

Vorbereitung der Kälber

- Nutzen Sie Einstreu (z. B. Stroh), die für die Anzahl der Tiere, die Fahrtzeit, das Wetter und die Aufnahme von Urin und Fäkalien geeignet und ausreichend ist
- Verwenden Sie seitliche Schutzgitter, um zu vermeiden, dass die Beine der Kälber zwischen dem Deck und den Seitenwänden eingeklemmt werden
- Begrenzen Sie beim Umgang mit Kälbern Gruppengrößen auf 10 - 15 Kälber
- Wenn eine Rampe verwendet wird, sollte die Steigung so gering wie möglich sein (maximaler Winkel von 20 ° bzw. 36%)
- Leiten Sie die Kälber mit individueller Hilfe auf die Rampe und ins Fahrzeug
- Bei langen Transporten kontaktieren Sie zeitnah den Empfänger bzw. die Kontrollstelle, um das sofortige Tränken und Füttern bei der Ankunft und die richtigen Klimabedingungen für die Kälber (z. B. Aufheizen des Gebäudes) zu arrangieren
- Es ist nicht erlaubt, Kälbern einen Maulkorb anzulegen!



©Henk van Dommelen



© IDELE

Transport von Kälbern

Füttern und Tränken



© Dr. Robitsch

Nicht-abgesetzte Kälber

Das Tränken von Kälbern auf dem Fahrzeug gilt als nicht praktikabel. Daher müssen **Kälber** möglicherweise **entladen** werden, um während der Pausen getränkt zu werden.



Abgesetzte Kälber

Geben Sie Absetzern ein Getreide-basiertes Futter während der Pausen. Allerdings **nur, wenn die Kälber das Futter gewohnt sind**. Plötzliche Veränderungen können dazu führen, dass sie krank werden.

Gutes Tränke-Management: 2 L / 12 Std

- **Füttern Sie Kälber einzeln** und halten Sie **Ruhezeiten von mindestens 1 Stunde** (besser 3 Stunden) ein, bevor Sie die Fahrt fortsetzen
- Stellen Sie sicher, dass das **Tränkesystem** sauber, gepflegt und funktionstüchtig ist
- Vergewissern Sie sich, dass die Kälber **mit dem Tränkesystem vertraut** sind, um Milch, Milchersatz oder Elektrolytlösungen der richtigen Temperatur aufzunehmen (verformbare Gummi-Zitzen verwenden)
- Wenn Kälber nicht wissen, wie man die Tränken benutzt, kann ein Tropfen an der Tränke helfen **Trinkverhalten zu initiieren** oder sie können mit dem Finger zu den Tränken geführt werden.
- **Überwachen Sie die Kälber genau**, um die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu gewährleisten. Wenn ein Kalb nicht aus dem Tränkesystem trinkt, Milch / Wasser manuell anbieten

Temperatur

Optimal Temperatur 5°C bis 25°C. Halten Sie die Temperatur konstant, Kälber reagieren empfindlich auf Temperaturveränderungen



- Stellen Sie **mehr Platz** zur Verfügung
- Zusätzliche **Ventilatoren**
- Falls nötig, **Wasser versprühen**
- Während Verzögerungen, **Kälber von Hand tränken**
- **Kein Transport über 30 °C**



- **Fahrzeug** vor der Beladung **aufheizen**
- **Zusätzliche Einstreu**
- Falls nötig, **zusätzliche Heizung** einsetzen